

CARTILASIN
500 mg, comprimate
Clorhidrat de glucozamină

COMPOZIȚIE

Un comprimat conține: clorhidrat de glucozamină 500 mg și excipienți: celuloză microcristalină, stearat de magneziu, povidonă, copovidonă, dioxid de siliciu coloidal.

ACȚIUNE

CARTILASIN este un supliment alimentar care conține clorhidrat de glucozamină.

Glucozamina este principalul component al țesuturilor moi (cartilaje, articulații, ligamente, tendoane, piele, etc). Odată cu îmbătrânirea scade capacitatea organismului uman de a produce cantitățile necesare de **glucozamină**.

S-a demonstrat că **glucozamina** are capacitatea de a opri degenerarea cartilajului, precum și de-a facilita regenerarea țesuturilor distruse. **Glucozamina** favorizează formarea cartilajului și, de asemenea, îmbunătățește funcția articulațiilor și reduce durerea în osteoartrite.

Glucozamina este un agent cunoscut, care este utilizat în osteoartrite și pentru accelerarea proceselor de regenerare ale țesuturilor moi în urma traumatismelor (luxații, ruptură de tendon etc.).

INDICAȚII

Comprimatele de CARTILASIN pot fi folosite în:

- accelerarea proceselor de regenerare a țesuturilor moi după diverse traumatisme accidentale (luxații, tendinite, etc);
- prevenirea fenomenelor degenerative;
- oprirea fenomenelor degenerative ale cartilajului, precum și la facilitarea regenerării țesuturilor distruse. Glucozamina favorizează formarea cartilajului, îmbunătățește funcția articulațiilor și contribuie la menținerea funcției și a structurii normale a cartilajelor articulare;
- reducerea durerii în osteoartrite și la mobilizarea articulațiilor afectate.

MOD DE ADMINSTRARE

Se administrează oral: câte 1 (un) comprimat de trei ori pe zi, pe o durată de 30-60 de zile

PRECAUȚII

Nu se recomandă administrarea de **CARTILASIN** dacă:

- sunteți alergic la clorhidrat de glucozamină (substanța activă) sau la oricare dintre celelalte componente ale **CARTILASIN**;
- sunteți alergic la crustacee marine;
- sunteți însărcinată sau alăptați.

CARTILASIN trebuie să fie utilizat cu precauție de persoanele cu diabet zaharat. Se impune monitorizarea regulată a nivelurilor de zahăr în sânge.

REAȚII ADVERSE

Nu s-au semnalat reacții adverse.

INTERACȚIUNI

La administrarea concomitentă a altor medicamente împreună cu **CARTILASIN**, acestea își pot influența reciproc efectele.

Glucozamina poate crește activitatea antiinflamatorie a medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) (aspirină, ibuprofen, diclofenac, indometacină etc.). Uneori, în administrarea concomitentă cu glucozamina, este necesară ajustarea dozei de antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la glucozamină și/sau la unul dintre excipienți.

Nu este indicat în timpul sarcinii și alăptării pentru că siguranța folosirii glucozaminei în astfel de stări nu a fost confirmată.

AMBALAJ

Blister din PVC/PDVC/Al a 10 comprimate.

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Pagina 2 din 2

Cutii din carton cu 3 blistere.

Cutii din carton cu 6 blistere.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A nu se lăsa la îndemana și vederea copiilor.

Se va păstra la temperaturi sub 25°C, ferit de umiditate și lumină, în ambalajul original.

Nu utilizați **CARTILASIN** după data de expirare înscrisă pe cutie/blister.

PRODUCĂTOR

Balkanpharma – Dupnitsa AD

Șos. Samokovsko nr.3, 2600 Dupnitsa, Bulgaria

Tel. (+0701) 58 333 / 58 196; Fax. (+0701) 58 555