

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Pagina 1 din 2

TROXEVASIN

Gel, 2%

Compoziție

100 g gel conțin troxerutină 2 g și excipienți: carbomer 980, edetat disodic, clorură de benzalconiu, trolamina, apă purificată.

Grupă farmacoterapeutică: medicația capilarelor (capilarotonice); bioflavonoide.

Indicații terapeutice

Troxevasin, gel 2%, este indicat pentru tratament simptomatic local în caz de:

- insuficiență venoasă cronică;
- boală varicoasă și hemoroizi;
- tromboflebite superficiale, acute și sindrom posttromboflebitic;
- dureri postfleboscleroză.

Contraindicații

Hipersensibilitate la troxerutină sau la oricare dintre excipienții produsului.

Precauții

Reacțiile de hipersensibilitate sunt mai frecvente la pacienți cu boli cutanate și/sau alergice.

Interacțiuni

Nu au fost constatate interacțiuni cu alte medicamente sau substanțe.

Troxevasin, gel 2%, poate fi administrat singur sau concomitent cu *Troxevasin*, capsule.

Atenționări speciale

Troxevasin, gel 2% se aplică numai pe suprafețe cutanate intacte. Acesta nu trebuie aplicat pe mucoase, răni deschise sau la nivelul ochilor.

Folosirea troxerutinei la pacienții cu hemoroizi obligă, în prealabil, la un diagnostic proctologic atent, pentru a exclude afecțiuni care necesită alte intervenții terapeutice.

În caz de criză hemoroidală folosirea troxerutinei nu dispensează de tratamentul specific pentru alte afecțiuni anale. Tratamentul cu troxerutină trebuie să fie de scurtă durată. Dacă simptomele nu cedează repede este necesară reconsiderarea atitudinii terapeutice.

Sarcina și alăptarea

În urma administrării *Troxevasin* la femelele gestante de șoarece și șobolan nu s-au evidențiat efecte embriotoxice și teratogene.

Totuși, nu se recomandă utilizarea produsului în primul trimestru de sarcină.

De asemenea, nu se recomandă administrarea în timpul alăptării.

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Troxevasin, gel 2% nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare

Troxevasin, gel 2%, este recomandat numai pentru aplicare locală.

Gelul se aplică în strat subțire pe suprafețele afectate de varice sau hemoroizi - tegumente, mucoasa anală intacte, de 2 ori/zi, dimineața și seara, masând ușor până la absorbția completă.

Reacții adverse

În cazuri rare este posibil să apară reacții alergice cutanate - urticarie, eczeme și dermatite.

Supradozaj

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj.

Ambalaj

Cutie cu un tub de aluminiu a 40 g gel.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Pagina 2 din 2

A nu se congela.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Producător

Balkanpharma-Troyan AD, Bulgaria

Deținătorul Autorizației de punere pe piață

Balkanpharma-Troyan AD, Str. Krayrechna 1, 5600 Troyan, Bulgaria

Data ultimei verificări a prospectului

Martie 2007